

МАТЕМАТИКА

Mathematical Subject Classification: 41A65, 41A17, 26A15, 26A16
УДК 517.5

Т. А. Агошкова, С. А. Пичугов

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта
имени ак. В. Лазаряна

АПРОКСИМАЦИЯ АНИЗОТРОПНЫХ КЛАССОВ ЛИПШИЦА В МЕТРИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВАХ L_ψ

Агошкова Т. А., Пичугов С. О. Апроксимация анизотропных классов Липшица в метрических пространствах L_ψ . Для пространств, определенных функцией ψ – типа модуля непрерывности, доведены в багатовимірному випадку пряма та обернена теореми типу Джексона та Бернштейна для усередненных приближений кусково-сталими функциями та отримана конструктивна характеристика анизотропных классов Липшица при підходящому розбитті тору періоду.

Ключові слова: модуль неперервності, кусково-стала функція, пряма та обернена теореми типу Джексона та Бернштейна, анизотропний клас Липшица.

Агошкова Т. А., Пичугов С. А. Апроксимация анизотропных классов Липшица в метрических пространствах L_ψ . Для пространств, определенных функцией ψ – типа модуля непрерывности, доказаны в многомерном случае прямая и обратная теоремы типа Джексона и Бернштейна для усредненных приближений кусочно-постоянными функциями и получена конструктивная характеристика анизотропных классов Липшица при подходящем разбиении тора периода.

Ключевые слова: модуль непрерывности, кусочно-постоянная функция, прямая и обратная теоремы типа Джексона и Бернштейна, анизотропный класс Липшица.

Agoshkova T. A., Pichugov S. A. Approximation of anisotropic Lipschitz classes in metric spaces L_ψ . For spaces defined by the function ψ of the type of modulus of continuity, we prove the direct and converse Jackson- and Bernstein-type theorems for the mean approximations by piecewise constant functions and we obtain a constructive characterization of anisotropic Lipschitz classes for a suitable partition of the period torus.
Key words: modulus of continuity, piecewise constant function, direct and converse Jackson- and Bernstein- type theorems, anisotropic Lipschitz class.

ВВЕДЕНИЕ. Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^m$ точек $x = (x_1, \dots, x_m)$, $m \geq 1$. Пусть $f(x)$ – действительные функции, имеющие период 1 по каждой переменной; $T^m = [0, 1)^m$ – основной тор периодов; $L_0(T^m)$ – множество всех таких функций, которые почти всюду на T^m конечны и измеримы; Ω – класс функций $\psi: \mathbb{R}_+^1 \rightarrow \mathbb{R}_+^1$, являющихся модулями непрерывности, то есть ψ – непрерывная неубывающая функция, $\psi(0) = 0$, $\psi(x+y) \leq \psi(x) + \psi(y)$ для всех $x, y \in \mathbb{R}_+^1$.

$L_\psi(T^m) = \{f \in L_0(T^m) : \|f\|_\psi := \int_{T^m} \psi(|f(x)|) dx < \infty\}$ – линейное метрическое пространство с метрикой $\rho(f, g)_\psi = \|f - g\|_\psi$. Среди пространств L_ψ важнейшими являются пространства $L_p(T^m)$, $0 < p \leq 1$ (случай $\psi(t) = t^p$) и $L_0(T^m)$ с топологией сходимости по мере: $\|f\|_0 = \int_{T^m} \psi(|f(x)|) dx$, $\psi(t) = \frac{t}{1+t}$.

Определение 1. Под модулем непрерывности функции f в пространстве $L_\psi(T^m)$ при $h \in \mathbb{R}_+^1$ будем понимать

$$\omega(f, h)_\psi = \sup_{\|t\|_\infty \leq h} \|\Delta_t f\|_\psi,$$

где $\|t\|_\infty = \max_{i=1, \dots, m} |t_i|$, $\Delta_t f(x) = f_t(x) - f(x)$, $f_t(x) = f(x_1 + t_1, \dots, x_m + t_m)$.

Определение 2. Для $\alpha \in (0, 1]$ определим классы Липшица

$$\Lambda_\psi^\alpha(T^m) = \{f \in L_\psi(T^m) : \omega(f, h)_\psi \leq C_f h^\alpha, h \in (0, \frac{1}{2})\}.$$

Для каждой из m координатных осей отрезок $[0, 1]$ разбиваем на отрезки равной длины с помощью 2^{j_k} равноотстоящих точек вида:

$$\frac{i_k}{2^{j_k}}, i_k = 0, 1, \dots, 2^{j_k} - 1,$$

где индекс k ($k = 1, \dots, m$) указывает номер оси.

Таким образом получаем разбиение основного тора T^m на $2^{\sum_{k=1}^m j_k}$ параллелепипедов вида:

$$\Pi_{i_1 \dots i_m} = \{x \in T^m : \frac{i_k}{2^{j_k}} \leq x_k < \frac{i_k + 1}{2^{j_k}}, k = 1, \dots, m\}, \quad (1)$$

где $i_k = 0, 1, \dots, 2^{j_k} - 1$, $k = 1, \dots, m$.

Определение 3. Определим через $L_{2^{j_1} \dots 2^{j_m}}$ пространство 1-периодических кусочно-постоянных функций $l_{2^{j_1} \dots 2^{j_m}}$, заданных следующим образом:

$$l_{2^{j_1} \dots 2^{j_m}}(x) = \sum_{i_1=0}^{2^{j_1}-1} \dots \sum_{i_m=0}^{2^{j_m}-1} b_{i_1 \dots i_m} \chi_{\Pi_{i_1 \dots i_m}}(x),$$

где $b_{i_1 \dots i_m} \in \mathbb{R}^1$ и $\chi_{\Pi_{i_1 \dots i_m}}(x) = \begin{cases} 1, & x \in \Pi_{i_1 \dots i_m} \\ 0, & x \notin \Pi_{i_1 \dots i_m} \end{cases}$.

Определение 4. $\bar{E}_{2^{j_1} \dots 2^{j_m}}(f)_\psi = \inf_{l_{2^{j_1} \dots 2^{j_m}} \in L_{2^{j_1} \dots 2^{j_m}} T^m} \int \|f_t - l_{2^{j_1} \dots 2^{j_m}}\|_\psi dt$ — усредненное приближение на периоде в метрике $L_\psi(T^m)$ функции f элементами подпространства $L_{2^{j_1} \dots 2^{j_m}}$.

Определение 5. Под частным модулем непрерывности функции f по переменной x_k ($1 \leq k \leq m$) в пространстве $L_\psi(T^m)$ при $h \in \mathbb{R}_+^1$ будем понимать

$$\omega_k(f, h)_\psi = \sup_{|t_k| \leq h} \|\Delta_{t_k e_k} f\|_\psi, k = 1, \dots, m,$$

где $\Delta_{t_k e_k} f(x) = f(x + t_k e_k) - f(x)$, e_k — вектор, k -я координата которого равна 1, а остальные координаты — нули.

Определение 6. Для $\alpha_i \in (0, 1]$, $i = 1, \dots, m$, определим анизотропные классы Липшица

$$\Lambda_{\psi}^{\alpha_1, \dots, \alpha_m}(T^m) = \{f \in L_{\psi}(T^m) : \exists C, \omega_k(f, h)_{\psi} \leq Ch^{\alpha_k}, h \in \left(0, \frac{1}{2}\right), k = 1, \dots, m\}.$$

Для периодических функций одной переменной из L_p при $0 < p < 1$, в случае приближения тригонометрическими полиномами, прямая и обратная теоремы Джексона были доказаны независимо в [1] и [2]. Из них следовала конструктивная характеристика классов Липшица $\Lambda_p^{\alpha}(T^1)$:

Теорема. [1], [2]. Пусть $f \in L_p(T^1)$, $0 < p < 1$. Тогда при $\forall \alpha \in (0, p)$ имеет место эквивалентность

$$f \in \Lambda_p^{\alpha}(T^1) \Leftrightarrow E_n^*(f)_p \leq C \left(\frac{1}{n}\right)^{\alpha}, n \geq 0,$$

где $E_n^*(f)_p = \inf_{T_n} \|f - T_n\|_p = \inf_{T_n} \int_0^1 |f(x) - T_n(x)|^p dx$ — наилучшее приближение f в $L_p(T^1)$ тригонометрическими полиномами степени не выше n .

А для периодических функций одной переменной из $L_{\psi}(T^1)$ прямая и обратная теоремы Джексона, в случае приближения тригонометрическими полиномами, были получены в [3], [4]. Выяснилось, что справедливость этих теорем зависит от нижнего показателя растяжения γ_{ψ} функции ψ .

Определение 7. [5, с. 75]. Пусть $\varphi(t)$, $t \in (0, \infty)$, — произвольная строго положительная всюду конечная функция. Ее функцией растяжения называют функцию $M_{\varphi}(s)$, $s \in (0, \infty)$,

$$M_{\varphi}(s) = \sup_{0 < t < \infty} \frac{\varphi(st)}{\varphi(t)}.$$

Общие свойства M_{φ} в [5, с. 75-78].

Определение 8. γ_{φ} — нижний показатель растяжения функции $\varphi(t) \in \Omega$, то есть:

- 1) $\gamma_{\varphi} \in [0, 1]$;
- 2) $M_{\varphi}(s) \geq s^{\gamma_{\varphi}}$, $\forall s \in (0, 1]$;
- 3) $\forall \varepsilon > 0 \exists C_{\varepsilon}$:

$$M_{\varphi}(s) \leq C_{\varepsilon} s^{\gamma_{\varphi} - \varepsilon}, s \in (0, 1).$$

Теорема. [3].

1. Если $\gamma_{\varphi} > 0$, то имеют место неравенства Джексона

$$\sup_n \sup_{\substack{f \in L_{\varphi}(T^1), \\ f \neq \text{const}}} \frac{E_n^*(f)_{\psi}}{\omega\left(f, \frac{1}{n}\right)_{\psi}} < \infty.$$

2. Если $\gamma_{\varphi} = 0$, то неравенства Джексона в форме

$$\sup_n \sup_{\substack{f \in L_{\varphi}(T^1), \\ f \neq \text{const}}} \frac{E_n^*(f)_{\psi}}{\omega(f, \alpha_n)_{\psi}} < \infty$$

невозможны ни при каком выборе последовательности $\{\alpha_n\}$, $\alpha_n > 0$, $\alpha_n \downarrow 0$.

Теорема. [4]. Пусть $\gamma_\psi > 0$. Тогда найдется константа $C = C(\psi)$ такая, что для всех $f \in L_\psi(T^1)$ и всех $h \in (0, \frac{1}{2}]$ имеют место неравенства

$$\omega(f, h)_\psi \leq C \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{1}{h} \rfloor} \frac{M_\psi(jh)}{j} E_{j-1}^*(f)_\psi.$$

Конструктивная характеристика классов Липшица $\Lambda_\psi^\alpha(T^1)$:

Следствие. [4]. Пусть $f \in L_\psi(T^1)$ и $\gamma_\psi > 0$, тогда при $\forall \alpha \in (0, \gamma_\psi)$ имеет место эквивалентность

$$f \in \Lambda_\psi^\alpha(T^1) \Leftrightarrow E_{n-1}^*(f)_\psi \leq K_f \left(\frac{1}{n} \right)^\alpha, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Таким образом, в случае приближения тригонометрическими полиномами, в пространствах $L_\psi(T^1)$ при $\gamma_\psi = 0$, например в L_0 , теорем Джексона нет, а значит и нет возможности получить конструктивную характеристику классов Липшица.

В [6] для периодических функций одной переменной из $L_\psi(T^1)$ доказаны прямая и обратная теоремы Джексона для усредненной аппроксимации кусочно-постоянными функциями с равномерным разбиением, откуда следовала конструктивная характеристика классов Липшица $\Lambda_\psi^\alpha(T^1)$:

Теорема. [6]. Для $\forall \psi \in \Omega$, $\forall f \in L_\psi(T^1)$ и $\forall \alpha \in (0, 1)$ имеет место эквивалентность

$$f \in \Lambda_\psi^\alpha(T^1) \Leftrightarrow \bar{E}_{2^k}^*(f)_\psi \leq C \left(\frac{1}{2^k} \right)^\alpha, \quad k \in \mathbb{N}.$$

В этом проявилось преимущество аппроксимации кусочно-постоянными функциями в сравнении с приближением тригонометрическими полиномами.

В [7] получен многомерный аналог прямой и обратной теорем Джексона для аппроксимации кусочно-постоянными функциями с равномерным разбиением тора периода и, как следствие, получена конструктивная характеристика изотропных классов Липшица $\Lambda_\psi^\alpha(T^m)$:

Теорема. [7]. Для $\forall \psi \in \Omega$, $\forall f \in L_\psi(T^m)$ и $\forall \alpha \in (0, 1)$ имеет место эквивалентность

$$f \in \Lambda_\psi^\alpha(T^m) \Leftrightarrow \bar{E}_{2^k \dots 2^k}^*(f)_\psi \leq C \left(\frac{1}{2^k} \right)^\alpha, \quad k \in \mathbb{N}.$$

В настоящей работе, в случае приближения кусочно-постоянными функциями с разбиением на m -мерные параллелепипеды основного тора периода, для усредненных приближений доказаны прямая и обратная теоремы Джексона. И при подходящем разбиении получена конструктивная характеристика анизотропных классов Липшица $\Lambda_{\psi^{\alpha_1, \dots, \alpha_m}}^{\alpha_1, \dots, \alpha_m}(T^m)$.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

1. Прямая и обратная теоремы Джексона.

Теорема 1. Для $\forall \psi \in \Omega$ и $\forall f \in L_\psi(T^m)$ справедливы неравенства:

$$\bar{E}_{2^{j_1} \dots 2^{j_m}}(f)_\psi \leq \sum_{k=1}^m \omega_k \left(f, \frac{1}{2^{j_k}} \right)_\psi. \quad (2)$$

Доказательство. Для оценки сверху достаточно ограничиться всюду плотным в L_ψ множеством непрерывных функций. В качестве аппроксимирующей функции выберем следующим образом определенную функцию $l_{2^{j_1} \dots 2^{j_m}}$ из $L_{2^{j_1} \dots 2^{j_m}}$:

$$\begin{aligned} l_{2^{j_1} \dots 2^{j_m}}(f, \mathbf{x}) &= \sum_{i_1=0}^{2^{j_1}-1} \dots \sum_{i_m=0}^{2^{j_m}-1} f \left(\frac{i_1}{2^{j_1}}, \dots, \frac{i_m}{2^{j_m}} \right) \chi_{\Pi_{i_1, \dots, i_m}}(\mathbf{x}). \\ \bar{E}_{2^{j_1} \dots 2^{j_m}}(f)_\psi &= \inf_{l_{2^{j_1} \dots 2^{j_m}} \in L_{2^{j_1} \dots 2^{j_m}}} \int_{T^m} \|f_t - l_{2^{j_1} \dots 2^{j_m}}\|_\psi d\mathbf{t} \leq \\ &\leq \int_{T^m} \|f_t - l_{2^{j_1} \dots 2^{j_m}}(f_t)\|_\psi d\mathbf{t} = \int_{T^m} \int_{T^m} \psi(|f_t(\mathbf{x}) - l_{2^{j_1} \dots 2^{j_m}}(f_t, \mathbf{x})|) d\mathbf{x} d\mathbf{t} = \\ &= \int_{T^m} \sum_{i_1=0}^{2^{j_1}-1} \dots \sum_{i_m=0}^{2^{j_m}-1} \int_{\frac{i_1}{2^{j_1}}}^{\frac{i_1+1}{2^{j_1}}} \dots \int_{\frac{i_m}{2^{j_m}}}^{\frac{i_m+1}{2^{j_m}}} \psi(|f_t(x_1, \dots, x_m) - f_t(\frac{i_1}{2^{j_1}}, \dots, \frac{i_m}{2^{j_m}})|) dx_1 \dots dx_m d\mathbf{t} = \\ &= \sum_{i_1=0}^{2^{j_1}-1} \dots \sum_{i_m=0}^{2^{j_m}-1} \int_{\frac{i_1}{2^{j_1}}}^{\frac{i_1+1}{2^{j_1}}} \dots \int_{\frac{i_m}{2^{j_m}}}^{\frac{i_m+1}{2^{j_m}}} \int_{T^m} \psi(|f_t(x_1 + \frac{i_1}{2^{j_1}}, \dots, x_m + \frac{i_m}{2^{j_m}}) - f(t)|) dt dx_1 \dots dx_m = \\ &= \sum_{i_1=0}^{2^{j_1}-1} \dots \sum_{i_m=0}^{2^{j_m}-1} \int_0^{\frac{1}{2^{j_1}}} \dots \int_0^{\frac{1}{2^{j_m}}} \int_{T^m} \psi(|f(x_1 + t_1, \dots, x_m + t_m) - f(t)|) dt dx_1 \dots dx_m. \end{aligned}$$

Рассмотрим отдельно полученное подинтегральное выражение

$$\begin{aligned} &\psi(|f(x_1 + t_1, \dots, x_m + t_m) - f(t_1, \dots, t_m)|) \leq \\ &\leq \psi(|f(t_1 + x_1, \dots, t_m + x_m) - f(t_1, t_2 + x_2, \dots, t_m + x_m)|) + \\ &+ \psi(|f(t_1, t_2 + x_2, \dots, t_m + x_m) - f(t_1, t_2, t_3 + x_3, \dots, t_m + x_m)|) + \\ &+ \dots + \psi(|f(t_1, \dots, t_{m-1}, t_m + x_m) - f(t_1, \dots, t_m)|). \end{aligned}$$

Таким образом, получаем

$$\begin{aligned} &\bar{E}_{2^{j_1} \dots 2^{j_m}}(f)_\psi \leq \\ &\leq \sum_{i_1=0}^{2^{j_1}-1} \dots \sum_{i_m=0}^{2^{j_m}-1} \int_0^{\frac{1}{2^{j_1}}} \dots \int_0^{\frac{1}{2^{j_m}}} (\|\Delta_{x_1 e_1} f\|_\psi + \dots + \|\Delta_{x_m e_m} f\|_\psi) dx_1 \dots dx_m = \\ &= 2^{j_1} \dots 2^{j_m} \int_0^{\frac{1}{2^{j_1}}} \dots \int_0^{\frac{1}{2^{j_m}}} \sum_{k=1}^m \|\Delta_{x_k e_k} f\|_\psi dx_1 \dots dx_m = \\ &= \sum_{k=1}^m 2^{j_k} \int_0^{\frac{1}{2^{j_k}}} \|\Delta_{x_k e_k} f\|_\psi dx_k. \end{aligned} \quad (3)$$

Из (3) следует (2). Теорема 1 доказана.

Пусть $\{j_k(\nu)\}_{\nu=1}^{\infty}$ – монотонно возрастающие последовательности натуральных чисел $j_k(\nu)$ при каждом фиксированном k , где $k = 1, \dots, m$. При фиксированном k ($k = 1, \dots, m$) с помощью последовательности $\{j_k(\nu)\}_{\nu=1}^{\infty}$ устраиваем разбиение соответствующей k -ой оси равноотстоящими точками:

$$\frac{i_k}{2^{j_k(\nu)}}, \quad i_k = 0, 1, \dots, 2^{j_k(\nu)} - 1.$$

Для удобства обозначим

$$\bar{E}_{2Q_\nu}(f)_\psi := \bar{E}_{2^{j_1(\nu)} \dots 2^{j_m(\nu)}}(f)_\psi, \quad l_{2Q_\nu} := l_{2^{j_1(\nu)} \dots 2^{j_m(\nu)}}, \quad \nu \in \mathbb{N}.$$

Далее получим неравенства типа Бернштейна для приращений кусочно-постоянных функций, которые будут использованы при доказательстве обратной теоремы Джексона.

Лемма. Для любой функции l_{2Q_ν} из L_{2Q_ν} , $\nu = 1, \dots, n$, $n \in \mathbb{N}$, при $h_k \in \left(0, \frac{1}{2^{j_k(n)}}\right]$ и для $|t_k| \leq h_k$ выполняются неравенства:

$$\|\Delta_{t_k e_k} l_{2Q_\nu}\|_\psi \leq h_k 2^{j_k(\nu)+1} \|l_{2Q_\nu}\|_\psi, \quad k = 1, 2, \dots, m. \quad (4)$$

Доказательство. Пусть $l_{2Q_\nu} \in L_{2Q_\nu}$, $\nu = 1, \dots, n$, тогда

$$\begin{aligned} \|l_{2Q_\nu}\|_\psi &= \sum_{i_1=0}^{2^{j_1(\nu)}-1} \dots \sum_{i_m=0}^{2^{j_m(\nu)}-1} \int_{\frac{i_1}{2^{j_1(\nu)}}}^{\frac{i_1+1}{2^{j_1(\nu)}}} \dots \int_{\frac{i_m}{2^{j_m(\nu)}}}^{\frac{i_m+1}{2^{j_m(\nu)}}} \psi(|b_{i_1 \dots i_m}|) dx_1 \dots dx_m = \\ &= \prod_{s=1}^m \frac{1}{2^{j_s(\nu)}} \sum_{i_1=0}^{2^{j_1(\nu)}-1} \dots \sum_{i_m=0}^{2^{j_m(\nu)}-1} \psi(|b_{i_1 \dots i_m}|). \end{aligned} \quad (5)$$

Так как $h_k \leq \frac{1}{2^{j_k(n)}}$, $k = 1, \dots, m$, то :

$$\begin{aligned} \|\Delta_{t_k e_k} l_{2Q_\nu}\|_\psi &= \int_{T^m} \psi(|\Delta_{t_k e_k} l_{2Q_\nu}|) dx \leq \\ &\leq 2 \sum_{i_1=0}^{2^{j_1(\nu)}-1} \dots \sum_{i_m=0}^{2^{j_m(\nu)}-1} \psi(|b_{i_1 \dots i_m}|) \mu\left(\Pi_{i_1 \dots i_{k-1}} \Pi_{i_k+t_k 2^{j_k}} \Pi_{i_{k+1} \dots i_m} / \Pi_{i_1 \dots i_m}\right), \end{aligned}$$

где $\mu(A)$ – m -мерная мера Лебега множества A .

Из определения разбиения (1) получаем

$$\mu(\Pi_{i_1 \dots i_m}) = \prod_{s=1}^m \frac{1}{2^{j_s(\nu)}}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} &\mu(\Pi_{i_1 \dots i_{k-1}} \Pi_{i_k+t_k 2^{j_k}} \Pi_{i_{k+1} \dots i_m} / \Pi_{i_1 \dots i_m}) = \prod_{s=1}^m \frac{1}{2^{j_s(\nu)}} - \\ &- \left(\frac{1}{2^{j_k(\nu)}} - t_k\right) \prod_{\substack{s=1 \\ s \neq k}}^m \frac{1}{2^{j_s(\nu)}} \leq \prod_{s=1}^m \frac{1}{2^{j_s(\nu)}} (1 - (1 - 2^{j_k(\nu)} h_k)) = \\ &= 2^{j_k(\nu)} h_k \prod_{s=1}^m \frac{1}{2^{j_s(\nu)}}. \end{aligned} \quad (6)$$

Из (5) и (6) вытекает

$$\begin{aligned} \|\Delta_{l_k, q_k} l_{2^{\nu}}\|_{\psi} &\leq 2^{j_k(\nu)+1} h_k \prod_{s=1}^m \frac{1}{2^{j_s(\nu)}} \sum_{i_1=0}^{2^{j_1(\nu)}-1} \cdots \sum_{i_m=0}^{2^{j_m(\nu)}-1} \psi(|b_{i_1 \dots i_m}|) = \\ &= 2^{j_k(\nu)+1} h_k \|l_{2^{\nu}}\|_{\psi}, \end{aligned}$$

$k = 1, 2, \dots, m$.

Лемма доказана.

Теорема 2. Для $\forall \psi \in \Omega$ и $\forall f \in L_{\psi}(T^m)$ при условии, что последовательности натуральных чисел $\{j_k(\nu)\}_{\nu=1}^n$ — монотонно возрастающие при каждом фиксированном k , где $k = 1, \dots, m$ и $n \in \mathbb{N}$, справедливы неравенства:

$$\omega_k \left(f, \frac{1}{2^{j_k(n)}} \right)_{\psi} \leq \frac{1}{2^{j_k(n)-2}} \sum_{\nu=1}^n 2^{j_k(\nu)} \overline{E}_{2^{\nu}}(f)_{\psi}, \quad k = 1, 2, \dots, m. \quad (7)$$

Доказательство. Фиксируем n . Так как $(l_{2^{\nu}} - l_{2^{\nu-1}})$ — кусочно-постоянная функция, то по лемме для $\nu \leq n$ имеем

$$\omega_k \left(l_{2^{\nu}} - l_{2^{\nu-1}}, \frac{1}{2^{j_k(n)}} \right)_{\psi} \leq \frac{1}{2^{j_k(n)}} 2^{j_k(\nu)} \|l_{2^{\nu}} - l_{2^{\nu-1}}\|_{\psi}. \quad (8)$$

Для заданной f и произвольного $\varepsilon > 0$ выберем $l_{2^{\nu}}$, $\nu = 1, \dots, n$, удовлетворяющие условиям:

$$\int_{T^m} \|f_t - l_{2^{\nu}}\|_{\psi} dt < \overline{E}_{2^{\nu}}(f)_{\psi} + \varepsilon. \quad (9)$$

Тогда, учитывая (8) и (9), получаем

$$\begin{aligned} \omega_k \left(f, \frac{1}{2^{j_k(n)}} \right)_{\psi} &= \int_{T^m} \omega_k \left(f_t, \frac{1}{2^{j_k(n)}} \right)_{\psi} dt \leq \int_{T^m} \omega_k \left(f_t - l_{2^{\nu}}, \frac{1}{2^{j_k(n)}} \right)_{\psi} dt + \\ &+ \omega_k \left(l_{2^{\nu}}, \frac{1}{2^{j_k(n)}} \right)_{\psi} = \int_{T^m} \omega_k \left(f_t - l_{2^{\nu}}, \frac{1}{2^{j_k(n)}} \right)_{\psi} dt + \\ &+ \omega_k \left(l_{2^{\nu}} - l_{2^{\nu-1}}, \frac{1}{2^{j_k(n)}} \right)_{\psi} \leq \int_{T^m} \omega_k \left(f_t - l_{2^{\nu}}, \frac{1}{2^{j_k(n)}} \right)_{\psi} dt + \\ &+ \sum_{\nu=1}^n \omega_k \left(l_{2^{\nu}} - l_{2^{\nu-1}}, \frac{1}{2^{j_k(n)}} \right)_{\psi} \leq 2 \int_{T^m} \|f_t - l_{2^{\nu}}\|_{\psi} dt + \\ &+ \frac{1}{2^{j_k(n)}} \sum_{\nu=1}^n 2^{j_k(\nu)} \int_{T^m} \|l_{2^{\nu}} - f_t + f_t - l_{2^{\nu-1}}\|_{\psi} dt < 2 (\overline{E}_{2^{\nu}}(f)_{\psi} + \varepsilon) + \\ &+ \frac{1}{2^{j_k(n)}} \sum_{\nu=1}^n 2^{j_k(\nu)} 2 (\overline{E}_{2^{\nu}}(f)_{\psi} + \varepsilon) \leq 2\varepsilon + 2 \frac{1}{2^{j_k(n)}} \sum_{\nu=1}^n 2^{j_k(\nu)} 2 (\overline{E}_{2^{\nu}}(f)_{\psi} + \varepsilon) = \\ &= \frac{1}{2^{j_k(n)-2}} \sum_{\nu=1}^n 2^{j_k(\nu)} \overline{E}_{2^{\nu}}(f)_{\psi} + 2\varepsilon \left(1 + \frac{1}{2^{j_k(n)-1}} \sum_{\nu=1}^n 2^{j_k(\nu)} \right), \end{aligned}$$

и ввиду произвольности ε отсюда следует (7).

Теорема 2 доказана.

2. Конструктивная характеристика анизотропных классов Липшица.

Теорема 3. Для $\forall \psi \in \Omega$, $\forall f \in L_\psi(T^m)$ и $\forall \alpha_k \in (0, 1)$, $k = 1, \dots, m$, имеет место эквивалентность:

$$f \in \Lambda_\psi^{\alpha_1, \dots, \alpha_m} \Leftrightarrow \overline{E}_{2^{[\frac{n}{\alpha_1}]}, \dots, 2^{[\frac{n}{\alpha_m}]}}(f)_\psi \leq A \left(\frac{1}{2^n} \right)^{\tilde{\alpha}}, \quad n \in \mathbb{N},$$

где $\tilde{\alpha} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \dots + \frac{1}{\alpha_m}}$ и A – константа, не зависящая от n .

Доказательство. Положим $j_k(\nu) = \left\lfloor \nu \frac{\tilde{\alpha}}{\alpha_k} \right\rfloor$, где $\nu \in \mathbb{N}$, $k = 1, \dots, m$.

Необходимость. Пусть $f \in \Lambda_\psi^{\alpha_1, \dots, \alpha_m}(T^m)$. Тогда, применяя теорему 1, получаем

$$\begin{aligned} \overline{E}_{2^{[\frac{n}{\alpha_1}]}, \dots, 2^{[\frac{n}{\alpha_m}]}}(f)_\psi &\leq \sum_{k=1}^m \omega_k \left(f, \frac{1}{2^{[\frac{n}{\alpha_k}]}} \right)_\psi \leq C \sum_{k=1}^m \left(\frac{1}{2^{[\frac{n}{\alpha_k}]}} \right)^{\alpha_k} < \\ &< C \sum_{k=1}^m \left(\frac{1}{2^{\frac{n}{\alpha_k} - 1}} \right)^{\alpha_k} = C \sum_{k=1}^m 2^{\alpha_k} \left(\frac{1}{2^{\frac{n}{\alpha_k}}} \right)^{\alpha_k} = A \left(\frac{1}{2^n} \right)^{\tilde{\alpha}}, \end{aligned}$$

где A – константа, не зависящая от n .

Достаточность. Пусть для любой функции $f \in L_\psi$ и $\forall \alpha_k \in (0, 1)$, $k = 1, \dots, m$, выполняются неравенства

$$\overline{E}_{2^{[\frac{n}{\alpha_1}]}, \dots, 2^{[\frac{n}{\alpha_m}]}}(f)_\psi \leq A \left(\frac{1}{2^n} \right)^{\tilde{\alpha}}. \quad (10)$$

При каждом фиксированном k ($k = 1, 2, \dots, m$) последовательности $\left\{ \left\lfloor \nu \frac{\tilde{\alpha}}{\alpha_k} \right\rfloor \right\}_{\nu=1}^n$ монотонно возрастают, поэтому по теореме 2 при $h_k = \frac{1}{2^{[\frac{n}{\alpha_k}]}}$ и, учитывая (10), получаем

$$\begin{aligned} \omega_k(f, h_k)_\psi &= \omega_k \left(f, \frac{1}{2^{[\frac{n}{\alpha_k}]}} \right)_\psi \leq \frac{1}{2^{[\frac{n}{\alpha_k}] - 2}} \sum_{\nu=1}^n 2^{[\nu \frac{\tilde{\alpha}}{\alpha_k}]} \overline{E}_{2^{[\frac{n}{\alpha_1}]}, \dots, 2^{[\frac{n}{\alpha_m}]}}(f)_\psi \leq \\ &\leq A \frac{1}{2^{[\frac{n}{\alpha_k}] - 2}} \sum_{\nu=1}^n 2^{[\nu \frac{\tilde{\alpha}}{\alpha_k}]} \left(\frac{1}{2^\nu} \right)^{\tilde{\alpha}} < A \frac{1}{2^{\frac{n}{\alpha_k} - 3}} \sum_{\nu=1}^n 2^{\nu \frac{\tilde{\alpha}}{\alpha_k}} \left(\frac{1}{2^\nu} \right)^{\tilde{\alpha}} = \\ &= \frac{A_1}{2^{\frac{n}{\alpha_k}}} \sum_{\nu=1}^n \left(2^{\tilde{\alpha} \left(\frac{1}{\alpha_k} - 1 \right)} \right)^\nu \leq \frac{A_2}{2^{\frac{n}{\alpha_k}}} 2^{n \tilde{\alpha} \left(\frac{1}{\alpha_k} - 1 \right)} = A_2 \left(\frac{1}{2^{\frac{n}{\alpha_k}}} \right)^{\alpha_k} = \\ &= A_2 \left(\frac{1}{2^{\frac{n}{\alpha_k}}} \right)^{\alpha_k} \leq A_2 \left(\frac{1}{2^{[\frac{n}{\alpha_k}]}} \right)^{\alpha_k}, \end{aligned}$$

где A_2 – константа, не зависящая от n .

Теперь для произвольного $h_k \in (0, \frac{1}{2}]$ ($k = 1, \dots, m$) найдем $n \in \mathbb{N}$ такое, что $\frac{1}{2^{[\frac{n}{\alpha_k}]}} \leq h_k < \frac{1}{2^{[\frac{n}{\alpha_k}] - 1}}$. Тогда

$$\omega_k(f, h_k)_\psi \leq \omega_k \left(f, \frac{1}{2^{[\frac{n}{\alpha_k}] - 1}} \right)_\psi \leq 2 \omega_k \left(f, \frac{1}{2^{[\frac{n}{\alpha_k}]}} \right)_\psi \leq B \left(\frac{1}{2^{[\frac{n}{\alpha_k}]}} \right)^{\alpha_k} \leq B h_k^{\alpha_k},$$

где B – константа, не зависящая от n .

Теорема 3 доказана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В представленной статье для усредненных приближений функций многих переменных доказаны прямая и обратная теоремы Джексона в случае приближения кусочно-постоянными функциями с разбиением на m -мерные параллелепипеды основного тора периода в пространствах L_ψ . Важнейшими представителями пространств L_ψ являются пространства L_p , $0 \leq p \leq 1$. При подходящем разбиении удалось получить конструктивную характеристику анизотропных классов Липшица $\Lambda_{\psi}^{\alpha_1, \dots, \alpha_m}(T^m)$, которая, в случае когда $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = \alpha$, дает конструктивную характеристику изотропных классов Липшица $\Lambda_{\psi}^{\alpha}(T^m)$.

1. Стороженко Э. А. Прямые и обратные теоремы типа Джексона в пространствах L_p , $0 < p < 1$ / Э. А. Стороженко, В. Г. Кротов, П. Освальд // Мат. сб. – 1975. – Т. 98, № 3. – С. 395–415.
2. Иванов В. И. Прямые и обратные теоремы теории приближения в метрике L_p для $0 < p < 1$ / В. И. Иванов // Мат. заметки. – 1975. – Т. 18, № 5. – С. 641–658.
3. Пичугов С. А. О теореме Джексона для периодических функций в метрических пространствах с интегральной метрикой. II / С. А. Пичугов // Укр. мат. журн. – 2011. – Т. 63, № 11. – С. 1524–1533.
4. Пичугов С. А. Обратные теоремы Джексона в пространствах с интегральной метрикой / С. А. Пичугов // Укр. мат. журн. – 2012. – Т. 64, № 11. – С. 351–362.
5. Крейн С. Г. Интерполяция линейных операторов / С. Г. Крейн, Ю. И. Петунин, Е. М. Семенов. – М.: Наука, 1978. – 400 с.
6. Пичугов С. А. Аппроксимация измеримых периодических функций по мере кусочно-постоянными функциями / С. А. Пичугов // Укр. мат. журн. – 1996. – Т. 48, № 5. – С. 711–715.
7. Агошкова Т. А. Аппроксимация в метрических пространствах периодических функций многих переменных кусочно-постоянными функциями / Т. А. Агошкова // Укр. мат. журн. – 2013. – Т. 65, № 10. – С. 1303–1314.